


## Samoubistvo



Terapija i lijekovi obično mogu pomoći većini osoba koje imaju samoubilačke namjere.

Liječenje mentalne bolesti i liječenje od zlouporabe opojnih sredstava mogu smanjiti rizik od samoubistva.



Samoubistva su jedanaesti po redu uzrok smrti u Sjedinjenim Džavama.

Osobe razmišljaju o samoubistvu kad su bez nade i ne vide drugi izlaz iz problema.

Obično se veže za ozbiljnu depresiju, alkohol ili zlouporabu opojnih sredstava, ili za značajan događaj koji je prouzrokovao dosta stresa.



Osobe koje su pod većim rizikom od samoubistva su muškarci-bjelci, iako žene i tinejdžeri prijavljuju više pokušaja samoubistva.

Ako neko pominje samoubistvo, treba to uzeti za ozbiljno.

Izvršite pritisak na tu osobu da hitno potraži pomoć liječnika ili da se javi u hitnu pomoć, ili da nazove 911.

Text is public domain from the MedlinePlus Health Topics Introductions series. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us>

**A Healthy Roads Media project**

[www.healthyroadsmedia.org](http://www.healthyroadsmedia.org)

Suicide (Bosnian) - Last Reviewed 2009